



باشد:

- کیست هیداتیک یک بیماری انگلی و مشترک بین انسان و دام است. کرم بالغ در روده سگ و نوزاد این کرم در بدن انسان و حیوان اهلی (نشخوارکنندگان) زندگی می کند.
 - کیست عفونی باشد.
 - در اندامهای حیاتی باشد.
 - کیست سطحی باشد و خطر پارگی وجود داشته باشد.
- فاکتورهایی از قبیل: سن، شغل و آداب و رسوم مردم نقش زیادی در انتقال بیماری دارد.

خودمراقبتی و توصیه پس از عمل جراحی

- ۱- داروها طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- ۲- استراحت کافی داشته باشید.
- ۳- در تاریخ توصیه شده به پزشک معالج مراجعه نمایید.
- ۴- اجازه استحمام و رانندگی را از پزشک معالج بگیرید.
- ۵- از بلند کردن اجسام سنگین حداقل ۴ تا ۶ هفته پرهیزید.
- ۶- بعد از اجازه پزشک رژیم مایعات محدود را شروع کنید و بسته به نظر پزشک رژیم غذایی را تغییر دهید.
- ۷- برای جلوگیری از روی هم خوابیدن ریه ها مرتباً هر ۳ تا ۴ ساعت تنفس عمیق داشته باشید.
- ۸- آموزشهایی که درباره تغییر وضعیت به شما داده شده را انجام دهید. زیرا دراز کشیدن طولانی مدت، بهبودی را کند می نماید.

علائم بیماری :

- بسته به محل درگیری علائم متفاوت می باشد.
- ۱- کبد: شایعترین محل برای درگیری می باشد که ممکن است نشانه هایی مثل بزرگی کبد و یا قولنج کبد و یا زردی دیده شود.
 - ۲- ریه: سرفه، تنگی نفس، دردهای قفسه سینه، خلط خونی
 - ۳- مغز: اختلالات عصبی، تاری دید، لرزش و صرع

روش تشخیص :

- رادیولوژی
- برونکوسکوپی
- سی تی اسکن
- سونوگرافی
- آزمایشهای سرولوژیکی و الایزا

درمان:

- ۱- در مواردی که کیست کوچک و محدود باشد درمان دارویی صورت می گیرد.
- ۲- در موارد زیر درمان اساسی جراحی می

- ۹-تعویض پانسمان محل عمل ، طبق
- دستور پزشک و در یک مرکز مناسب انجام شود.
- از بین بردن سگهای ولگرد
- کشتار دام در سنین پایین تر(مانعت از بزرگ شدن کیست هیداتیک)
- عدم تغذیه سگ ها با باقیمانده امعاء واحشای کشتارگاهی
- آموزش همگانی در مورد انتقال وانتشار بیماری
- تب
- خونریزی
- عفونت وترشح چرکی محل عمل
- تورم محل عمل

عوارض بعد از عمل جراحی :

آموزش و ارتقاء بهداشت فردی :

- رعایت بهداشت فردی ومحیط
- ضدعفونی کردن سبزی ها
- محصور کردن مزار کشت سبزی
- معدوم ساختن اندام های الوده به کیست هنگام ذبح دام
- خوراندن داروهای ضدانگل به سگهای شناسنامه دار و گله
- کشتار دام در کشتارگاههای بهداشتی
- دفع بهداشتی احشاء آلوده دام
- واکسیناسیون گوسفندان علیه بیماری
- اجتناب از تماس با مدفوع سگ
- عدم تماس با سگ سانان