

*مسمومیت با ترامادول

*مسمومیت دارویی

ترامادول به عنوان ضد درد استفاده میشود و از خانواده مورفین می باشد.



مسمومیت دارویی مجموعه ای از اختلالات بدن است که در اثر جذب ماده ای بیگانه که به آن سم گفته می شود بروز می کند. یکی از شایعترین مسمومیت ها مسمومیت با بنزو دیازپین و مسمومیت با ترامادول می باشد.

*مسمومیت با بنزودیازپین ها

علائم مسمومیت با ترامادول

علائم در بیماران مسمومیت با بنزودیازپینها

- تنگ شدن مردمک چشم
- افت سطح هوشیاری و خواب آلودگی
- تشنج
- گیجی
- سردرد
- بی خوابی
- یبوست
- تهوع

- خواب آلودگی
- تکلم نامفهوم
- افت فشار خون
- آهسته شدن حرکات
- تهوع
- استفراغ
- اسهال
- کاهش درجه حرارت

- نارسایی تنفس و مشکل در تنفس
- لرزش در دست و اندام ها

از علائم دیگر مسمومیت با بنزودیازپین ها کاهش سطح هوشیاری می باشد و روی حافظه اثر می گذارد.

در صورت استفاده از ترامادول (جهت ترک اعتیاد

- و...نباید رانندگی کرد و از کار در ارتفاعات و کار با استفاده از وسایل برنده خودداری کند.
- در افت هوشیاری که در مصرف با ترامادول ایجاد میشود باید به تدریج از حالت خوابیده به حالت نشسته در بیاید و کمی استراحت کند و سپس به حالت ایستاده در آید.
- **اقدامات در برخورد با بیمارانی که دچار مسمومیت دارویی شده اند:**

- خوابا نندن بیمار به پهلو جهت کاهش خطر آسپیراسیون. دور کردن عامل مسمومیت و مواد محرک از دسترس بیمار
- ***پیشگیری از مسمومیت مجدد**
- تنظیم دوز دارو ها توسط پزشک و عدم دخالت بیمار و دستکاری دوز مصرفی
- در صورتی که جنبه خودکشی داشته باشد،درمان روانپزشکی توصیه می شود.

*پیشگیری در منزل

- اولین اقدام در بیماران با مسمومیت دارویی رساندن بیمار به مراکز درمانی می باشد .
- جلوگیری از جذب بیشتر دارو با القاء استفراغ
- افزایش دفع سموم و داروهای جذب شده
- **پیشگیری از مسمومیت مجدد**
- محدودیت مصرف مایعات چون باعث جذب داروها استفاده شده توسط بیمار می شود.
- حمایت روانی بیمار
- بر مصرف دارو توسط بیمار ،توسط خانواده، نظارت کافی وجود داشته باشد.

منابع:

مسمومیت دارویی و اقدامات اورژانسی-دانشگاه

علوم پزشکی ایران

crtha.iums.ac.ir

تاییدکننده: دکتر علیرضا یزدان پناه(مدیر گروه بیهوشی)
تهیه کننده: الهام رضائی پور(سوپروایزر آموزش سلامت)